

شناخت درمان با داروی کلگزان

کلگزان چیست؟

کلگزان یک نوع داروی ضد انعقادی است که به منظور کاهش میزان خطر ایجاد لخته های خونی استفاده می شود. کلگزان که گونه ای هیپارین با وزن مولکولی کم است برای درمان آن دسته از بیمارانی که لخته های خون در بدن ایشان تشکیل یافته است نیز استفاده می شود.

چرا شما به کلگزان نیاز دارید؟

لخته خون می تواند در ورید های عمقی بدن و به طور معمول در پاها تشکیل شود. این وضعیت در علم پزشکی ترومبوز وریدهای عمقی (DVT=Deep Vein Thrombosis) نامیده می شود.

وجود چنین لخته هایی در بدن ممکن است سریعاً کشنده نباشد اما عدم درمان آن نیز می تواند با خطر بروز مشکلاتی همراه باشد.

لخته تشکیل شده ممکن است جدا شده باشد و در جریان خون به حرکت در آید (آمبولی). در طی این اتفاق لخته می تواند در جایی مثل ریه گیر بیفتد و آمبولی ریوی

(PE=Pulmonary Emboli) ایجاد کند که این حالت خود به صورت بالقوه کشنده است.

باید ها و نباید ها در تزریق کلگزان:

باید پس از تمیز کردن محل تزریق با الکل اجازه دهید آن محل خشک شود؛ وجود رطوبت موجب افزایش احساس سوزش می شود.

باید چین پوستی شکم را تا پایان تزریق به آرامی نگه دارید. با نگه داشتن پوست بین انگشتان خود در طی انجام تزریق ، دارو تنها وارد بافت چربی شکم می شود و به عضله نمی رسد.

باید در هر بار تزریق محل تزریق را عوض کنید.

باید سرنگ را پس از تزریق در محفظه ای ایمن ببندازید.

باید دارو را به همان میزان که پزشک برای شما تجویز کرده است مصرف نمایید.

باید داروی کلگزان را هر روز در زمانی معین و بر اساس نسخه خود مصرف نمایید.

باید مراقب بروز علائم غیر عادی از قبیل کبودی ، حساسیت ، خونریزی داخل پوستی در محل تزریق و همچنین ترشح ، گرم شدن ، درد و قرمزی در محل تزریق قدیمی باشید و در صورت مشاهده بلافاصله با پزشک تماس بگیرید.

باید هنگام اصلاح ، استفاده از چاقو و سایر ابزار برنده دقت کافی به عمل آورید.

باید در صورت استفاده از داروهای دیگر و مکمل های غذایی یا گیاهی به پزشک خود اطلاع دهید. برخی داروها بر نحوه عملکرد کلگزان تأثیر می گذارند و ممکن است موجب بروز مشکلاتی جدی شوند. همچنین در صورتی که قصد دارید داروی دیگری را شروع نمایید، قطع کنید و یا تغییر دهید پزشک خود را مطلع سازید.

نباید پس از برداشتن سرپوش سوزن آن را به طرف پایین بگیرید. و یا اجازه دهید با چیزی تماس پیدا کند . رعایت این مسئله به استریل ماندن سرنگ کمک می کند.

نباید سرپوش سوزن را برای درآوردن بیچانید چرا که ممکن است باعث خم شدن سوزن گردد.

نباید کلگزان را درون زخم ، کبودی و یا جایی که لباس می تواند با آن تماس داشته و یا روی آن کشیده شود تزریق کنید. **نباید** پس از تزریق، محل تزریق را ماساژ دهید وگرنه باعث ایجاد کبودی می شود.

نباید کلگزان را منجمد نمایید . آن را در دمای اتاق نگهداری کنید .

هو الشافي



موسسه خدمات درمانی البرز

با آرزوی سلامت روز افزون برای شما

پمفلت آموزشی
داروی کلگزان

تهیه کننده: بخش بیمه تکمیلی ۱ (VIP)

بازنگری: اردیبهشت ۹۶

تنظیم: واحد آموزش



نباید در صورت مصرف کلگزان و یا وارفارین (داروی ضد انعقادی خوراکی که به نام کومادین شناخته می شود) همزمان از داروهای زیر نیز استفاده کنید مگر آنکه پزشک این اجازه را به شما داده باشد:

- آسپرین یا محصولات حاوی آسپیرین
 - سایر داروهای مهار کننده پلاکت مثل کلوییدوگرل (Clopidogrel)
 - سالیسیلات ها (داروهای شبه آسپیرینی)
 - داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAIDS)
 - داروهای سرماخوردگی ، ضد آلرژی یا مسکن های حاوی هر کدام از این داروها
 - استفاده از این داروها می تواند مدت زمان لازم برای منعقد شدن خون را طولانی کرده و ممکن است مصرف همزمان آنها با کلگزان و یا وارفارین خطر خونریزی را افزایش دهد.
- نباید** کلگزان در دسترس هیچ فرد دیگری به جز کسی که این دارو برای ایشان تجویز شده است قرار گیرد.

