

۷. در صورتی که عفونت به علت میکروب خاصی باشد بیمار باید ایزوله شود و اطرافیان باید ماسک بزنند.
۸. در صورت صلاح‌دید پزشک درمان آنتی بیوتیک باید صورت گیرد.

\* **کودک گه دهار پنومونی می شود اگر زود درمان شود ، سلیع بهبود می یابد و ریه کودک در عرض ۴-۸**

**هفتنه به هالت طبیعی بر می گردد.**



### توصیه های خود مراقبتی:

۱. پائین آوردن تب کودک با پاشویه صحیح و دادن داروهای ضد تب که پزشک تجویز می کند.
۲. برای راحت تر نفس کشیدن کودک باید هوای اطراف کودک مرطوب باشد برای این کار باید دستگاه بخور گرم و مرطوب بالای سر کودک روشن باشد.
۳. کودک در وضعیت نیمه نشسته قرار گیرد ، سر بالا تر باشد تا تنفس راحت تر صورت گیرد.
۴. در صورت تنگی نفس و تنفس سریع از دادن مواد غذایی از دهان خودداری کنید چون احتمال برگشت به داخل ریه وجود دارد.
۵. در صورتی که کودک مجاز به خوردن شد مایعات به اندازه کافی به او بدهید و در صورت تحمل مایعات کودک را تشویق به تغذیه مناسب کنید . مواد غذایی باید ساده ، آب پز و بدون ادویه و افزودنی های دیگر باشد.
۶. فیزیوتراپی تنفسی جهت پاکسازی مسیر تنفس باید صورت گیرد . جهت این کار کودک را به طرف ریه آسیب دیده بخوابانید و با دست خود به پشت کودک ضربه های آرامی از قسمت پائین ریه به سمت بالا وارد کنید تا ترشحات از قسمت پائین به سمت بالا حرکت کنند و به صورت خلط دفع شوند .



بیماری پنومونی ، التهاب قسمتی از ریه و کیسه های هوایی میباشد که در آن خلط و ترشحات ، مسیر تنفس را بسته و تنفس را مشکل میکند . در نتیجه کودک دچار تنفس سطحی شده و اکسیژن خونش پایین می آید . کودک ممکن است بدنبال یک سرماخوردگی شدیدکه درمان نشده باشد مبتلا به پنومونی شود .

**علائم:**

سرفه، درد قفسه سینه ، تب ( ۳۹ تا ۴۰ درجه)، تنفس ( ۴۰ تا ۸۰ در یک دقیقه ) ، تنفس نبض ، کبود شدن پوست بخصوص اطراف دهان ، بی حالی، بی اشتہایی، استفراغ، اسهال و در شیرخواران با بی قراری و خوب شیر نخوردن و سرفه و عطسه، اتساع شکم و دردشکم همراه است .



هو الشافي



موسسه خدمات درمانی البرز

با آرزوی سلامتی و موفقیت



تهییه کننده: بخش اطفال

بازنگری: اردیبهشت ۹۶

تنظیم: واحد آموزش

